

TDA/H : intérêt de l'association entre pharmacothérapie et psychothérapie analytique ? ADHD: The relevance of associating pharmacotherapy and psychodynamic psychotherapy?

Abstract

Interest in attention deficit disorder/attention deficit hyperactivity disorder (ADD/ADHD) is growing, as evidenced by the number of scientific publications on the topic, as well as by the number of requests for child psychiatric consultations to diagnose ADD. The current clinical consensus is the result of the long evolution of a historical dichotomy between advocates for an organogenetic or psychopathological etiology of the disorder. Today, we question whether a “double reading” is possible taking into consideration both neuro-developmental factors as well as psychopathological elements? The contribution of complexity theorists and developmental phenomenology could help to conceptualize the ADD/ADHD as a complex and multifactorial disorder, which would support a “transversal” therapeutic approach involving psychoanalytical and psychopharmacology. However, questions remain regarding the effectiveness of psychoanalytical therapy and its association with pharmacotherapy in treating ADHD – and there appears to be little evidence of its effectiveness in existing literature. Thus, the possibility of a future therapeutic consensus for ADHD could be expected.



Disponible en ligne sur

ScienceDirect
www.sciencedirect.com

Elsevier Masson France

EM|consulte
www.em-consulte.com



Mémoire

TDA/H : intérêt de l'association entre pharmacothérapie et psychothérapie analytique ?



ADHD: The relevance of associating pharmacotherapy and psychodynamic psychotherapy?

Valérie Adrian

Centre Jean-Abadie, CHU de Bordeaux, 89, rue des Sablières, 33076 Bordeaux, France

INFO ARTICLE

Historique de l'article :

Reçu le 29 novembre 2013
Accepté le 15 décembre 2013
Disponible sur Internet le 3 mars 2014

Mots clés :

Cas clinique
Efficacité
Méthylphénidate
Psychanalyse d'enfant
Psychothérapie
Revue de la littérature
Thérapeutique médicamenteuse
Trouble déficitaire de l'attention
hyperactivité

Keywords:

Attention deficit disorder with
hyperactivity
Case reports
Drug therapy
Evaluation studies as topic
Methylphenidate
Psychoanalytical therapy for children
Review

RÉSUMÉ

L'intérêt porté au TDA/H va croissant, comme en témoignent le nombre de publications scientifiques sur ce thème et le nombre de demandes de consultations pédopsychiatriques au motif initial de diagnostic de TDA/H. Le consensus clinique actuel est le fruit de la longue évolution d'une dichotomie historique opposant les tenants en faveur d'une étiopathogénie organogénétique ou psychopathologique du trouble. De nos jours, une « double lecture », conjointement neuro-développementale et psychopathologique, semble possible. L'apport des théoriciens de la complexité et de la phénoménologie développementale pourrait permettre de conceptualiser le TDA/H comme le paradigme d'un trouble complexe et multifactoriel. Cette conceptualisation influence la question des indications thérapeutiques qui doivent s'organiser sur un mode multimodal. Elle interroge plus particulièrement l'intérêt des psychothérapies analytiques et des associations entre pharmacothérapie et psychothérapie analytique, associations dont l'efficacité et les mécanismes processuels restent peu décrits dans la littérature. Cet aspect sera discuté à partir d'un cas clinique et d'une revue de la littérature. Un consensus thérapeutique à venir pourrait être envisageable.

© 2014 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

ABSTRACT

Interest in attention deficit disorder/attention deficit hyperactivity disorder (ADD/ADHD) is growing, as evidenced by the number of scientific publications on the topic, as well as by the number of requests for child psychiatric consultations to diagnose ADD. The current clinical consensus is the result of the long evolution of a historical dichotomy between advocates for an organogenetic or psychopathological etiology of the disorder. Today, we question whether a “double reading” is possible taking into consideration both neuro-developmental factors as well as psychopathological elements? The contribution of complexity theorists and developmental phenomenology could help to conceptualize the ADD/ADHD as a complex and multifactorial disorder, which would support a “transversal” therapeutic approach involving psychoanalytical and psychopharmacology. However, questions remain regarding the effectiveness of psychoanalytical therapy and its association with pharmacotherapy in treating ADHD – and there appears to be little evidence of its effectiveness in existing literature. Thus, the possibility of a future therapeutic consensus for ADHD could be expected.

© 2014 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

1. Introduction

Signe des temps, la littérature pédopsychiatrique française sur le thème de l'hyperactivité connaît une expansion remarquable.

L'hyperactivité apparaît « comme un paradigme sur lequel converge toute une série de problématiques actuellement au cœur même des débats sur la pédopsychiatrie et sur sa place dans la société » [22].

Soulevant « débats » et « plaidoyers », la clinique du Trouble Déficit Attentionnel avec ou sans Hyperactivité (TDA/H) pose invariablement la question suivante : une « double lecture »,

Adresses e-mail : valerie.adrian@chu-bordeaux.fr, valerie.adrian@orange.fr

lecture conjointement neuro-développementale et psychopathologique, est-elle possible ? À partir de l'expérience professionnelle de l'auteur, associant d'une part, une collaboration ancienne au Centre de Compétence sur le TDA/H au sein du Pôle Universitaire de Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent de Bordeaux et, d'autre part, une activité de psychothérapeute d'inspiration analytique en cabinet libéral, ce mémoire a pour objet de tenter de dégager des arguments en faveur d'un modèle de compréhension plurifactoriel et complexe du TDA/H et de décrire les conséquences de cette définition sur les choix thérapeutiques, plus particulièrement au sujet des indications des psychothérapies psychanalytiques. Les adaptations du cadre thérapeutique pour les prises en charge des enfants souffrant de TDA/H et de leurs parents seront envisagées. Enfin, les effets de l'association thérapeutique entre traitement médicamenteux par psychotrope de type psychostimulant et psychothérapie d'inspiration psychanalytique seront discutés.

2. D'un consensus clinique vers un consensus thérapeutique ?

De nos jours, parmi la multiplicité des formes conceptuelles de l'hyperactivité, la clinique du TDA/H occupe une place centrale et singulière.

Il est connu que le nombre de demandes de consultations pédopsychiatriques au motif d'une symptomatologie de TDA/H va croissant. Cette donnée concorde avec celle des études épidémiologiques qui situent la prévalence du TDA/H aux environs de 5 % chez les enfants et adolescents et de 2 % en population adulte [19].

Cette augmentation est à considérer dans un contexte socio-culturel d'évolution de la demande de soins des parents s'inscrivant dans un mouvement législatif du droit des patients et de l'accès à une scolarisation traditionnelle pour les enfants « en situation de handicap ». La médecine est devenue informationnelle et l'annonce d'un diagnostic une attente légitime des patients.

L'historique des parcours de soins des patients souffrant de TDA/H demeure trop souvent plus révélateur des appartenances et croyances des professionnels rencontrés que de la réalité des besoins thérapeutiques des patients. De nombreux parents témoignent de leur incompréhension face aux discours polymorphes des professionnels de santé. Cette mise en tension incompréhensible au consultant adulte, ce qui nous laisse redouter comment un enfant ou un adolescent pourrait s'en saisir, reflète la dichotomie historiquement présente autour des modélisations conceptuelles de la clinique de l'instabilité psychomotrice au fil des décennies.

2.1. Les difficultés d'une naissance : évolution historique du concept de TDA/H

Les variations des conceptualisations de l'hyperactivité, qu'elles soient historiquement et classiquement nord-américaines versus européennes, ont toujours interrogé l'étiopathogénie du trouble en s'étayant sur des référentiels théoriques, soit en faveur d'une organogénèse, soit en faveur d'une psychogénèse.

La position pédopsychiatrique française sur l'instabilité psychomotrice s'est dessinée plus nettement à partir des travaux d'Henri Wallon, *L'enfant turbulent*, en 1925 et de la thèse de J. Abramson, « L'enfant et l'adolescent instable » en 1940. En Europe, au siècle dernier, le débat clinique semble s'être situé entre les deux pôles décrits par Ajuriaguerra décrivant la forme subchoréique comme un syndrome constitutionnel et la forme affectivo-caractérielle considérée comme un symptôme modulé par l'environnement [1].

Dès 1949, Ajuriaguerra a soutenu l'idée que l'éternel débat qui consistait à opposer les formes dites « motrices » aux formes que l'on pourrait qualifier de « psychiques » ne permettait pas

d'appréhender l'hétérogénéité et la complexité de la clinique de l'hyperactivité [11].

L'évolution des conceptions nord-américaines et anglo-saxonnes du trouble est elle-même révélatrice de changements paradigmatiques, au sens des révolutions paradigmatiques de Thomas Kuhn [1]. Chaque version du DSM a proposé de nouvelles dénominations du trouble tout en évoluant progressivement d'une conception purement organiciste, héritée des grandes épidémies encéphalitiques du début du ^{xx}e siècle, vers une conceptualisation neuro-développementale dans le DSM-5, suivant le courant cognitivo-comportementaliste. Rappelons que depuis les travaux de Thomas et Wilhem en 1997, le déficit attentionnel est considéré comme un facteur étiopathogénique central du TDA/H [38].

La dichotomie entre l'hyperactivité/symptôme ou entité syndromique a elle aussi nourri de nombreux débats : « L'instabilité est-elle un symptôme s'inscrivant diversement dans des fonctionnements psychiques très différents, une manière psychosomatique et psychomotrice d'être au monde... ou existe-t-il un véritable syndrome et derrière une organisation psychopathologique générique et spécifique de ces enfants dits instables ? » [3]. De ce point de vue, les psychanalystes français ont soutenu, et soutiennent encore pour partie, la référence à l'instabilité en tant que symptôme. Pourtant, les travaux de recherche psychanalytiques sur le TDA/H se multiplient au plan international comme en témoigne l'article de Robert qui souligne l'importance de la synchronicité des interactions précoces, des processus d'internalisation comme étant à l'origine du développement des capacités de mentalisation et du rôle des tempéraments dans l'étiopathogénie du TDA/H [35].

Une reconnaissance plus ou moins consensuelle semble se dégager aujourd'hui, bien qu'il ne soit pas indifférent d'utiliser certaines terminologies comme TDA/H ou ADHD sans que n'y soit inféré un référentiel théorique implicite et « assumer la dénomination anglo-saxonne hyperactivité (ADHD – traduit en français par Trouble Hyperactivité avec Déficit Attentionnel) n'implique nullement d'adhérer à la théorie-idéologie ? – étiologique organiciste implicite du DSM-IV » [31].

2.2. Du point de vue des théoriciens de la complexité

Morin définit un phénomène complexe comme « un tissu de constituants hétérogènes qui constituent notre mode phénoménal ». Est complexe « ce qui ne peut se résumer en un maître mot, ce qui ne peut se ramener à une loi, ce qui ne peut se réduire à une idée simple » [32].

L'étude de la clinique des sujets TDA/H constitue, de ce point de vue, un objet hypercomplexe qui appréhende la souffrance du sujet « dans sa dimension psychique et développementale, subjective et relationnelle, instrumentale et cognitive, tout à la fois et inséparablement » [26].

La complexité psychopathologique justifie que l'on allie les niveaux d'observation, de compréhension et d'étude d'un phénomène à partir de l'organisation singulière du sujet et de sa fonctionnalité psychique. Ajuriaguerra préconisait l'observation d'une fonction ou d'un trouble « à partir de l'équipement neuro-génétique du sujet via son développement précoce et des interactions de ce dernier avec les facteurs environnementaux et existentiels au regard de la dialectique psychique du sujet » [26]. Ces préconisations justifient de la mise en œuvre d'au moins une dualité épistémique, si ce n'est plus.

De fait, le développement de l'enfant se déroule à l'interface de facteurs endogènes (génétiques, tempéramentaux, biologiques, psychologiques et cognitifs) et de facteurs exogènes au sens d'un environnement élargi comprenant l'environnement écologique, social et relationnel. Cette notion renvoie à l'héritage freudien du concept de « série complémentaire » [21]. L'apport des travaux de

recherche en génétique et épigénétique pourrait ici s'avérer particulièrement fructueux.

Le Trouble Déficit Attentionnel/Hyperactivité, reconnu d'apparition précoce et d'origine multifactorielle [16], correspond précisément à ce modèle de psychopathologie polyfactorielle justifiant d'une modélisation intégrative et complexe [12], qui tient compte de la néoténie fondamentale du sujet dont la construction neuro-développementale et psycho-affective gagne à être conceptualisée sous la forme d'un processus développemental.

2.3. Hétérogénéité clinique

L'histoire des variations et des limites de la nosographie souligne la grande hétérogénéité clinique du TDA/H.

La psychopathologie développementale du trouble, son expression phénoménologique en fonction de l'âge du sujet contribue grandement à augmenter l'hétérogénéité clinique. On distingue classiquement des variations phénoménologiques selon les grandes phases du développement psychoaffectif, soit une symptomatologie précoce prémorbide, une symptomatologie de la période de latence, âge à partir duquel le diagnostic du trouble peut être porté, la « course orageuse » de l'évolution clinique à l'adolescence et la possibilité de la persistance ou de retentissement du trouble à l'âge adulte [1]. De plus, les études épidémiologiques ont montré l'existence de variations de l'expression clinique en fonction du sexe du sujet. L'âge et le sexe de l'enfant contribuent aussi conjointement à modifier la clinique du trouble [5]. S'y ajoute une composante situationnelle.

De nombreuses études internationales ont montré l'importance de la comorbidité psychiatrique pour plus de la moitié des patients souffrant de ce trouble. Classiquement, le taux de prévalence est compris, en fonction des études, entre 42 et 93 % pour le Trouble Oppositionnel/Trouble des Conduites, entre 13 et 27 % pour la dépression, entre 25 et 50 % pour les Troubles Anxieux, entre 10 et 92 % pour les Troubles des Apprentissages [5]. La comorbidité psychiatrique influence l'expression clinique, le retentissement et le pronostic évolutif du TDA/H. La place de la comorbidité avec le Trouble bipolaire fait débat, cette forme clinique étant particulièrement sévère [39]. Ces données confirment l'importance de la comorbidité, condition inhérente à la clinique du trouble selon Ajuriogerra, et des difficultés diagnostiques qui lui sont associées.

Le modèle clinique du TDA/H proposé par Joly [27] comme prototypique et pathognomonique de trois instabilités permet de clarifier l'hétérogénéité du trouble. Il y décrit trois instabilités :

- instabilité purement motrice ;
- instabilité psychique et idéique avec les difficultés attentionnelles et leurs retentissements dans le champ cognitif et des apprentissages ;
- instabilité psychoaffective, de l'humeur avec la difficulté à gérer les émotions, la labilité émotionnelle, l'impulsivité, l'intolérance à la frustration et l'opposition.

Ce tableau prototypique se complète de troubles associés :

- des conséquences instrumentales et cognitives de la série des « dys » (dyslexie, dysorthographe, dyscalculie, dysgraphie) ;
- des difficultés d'intégration sociale ;
- des symptômes de la lignée anxio-dépressive ;
- d'une fragilité narcissique avec, en contrepoint, de manière mégalomaniacale, la triade « Même pas peur, même pas mal, même pas triste ».

Enfin, la complexité clinique intrinsèque à l'expression phénoménologique du trouble et des comorbidités associées

souligne l'intérêt des modélisations du trouble sous la forme de trajectoires développementales, issues de méthodologies épidémiologiques et pouvant contribuer à une meilleure compréhension de la participation des mécanismes génétiques et épigénétiques dans l'étiopathogénie du trouble.

3. Intérêt des thérapies d'inspiration psychanalytiques chez les enfants et adolescents TDA/H

3.1. Quelques études existantes

Les études évaluant l'efficacité des psychothérapies d'inspiration psychanalytiques chez des sujets souffrant de TDA/H restent rares dans la littérature française et internationale, bien qu'il existerait de nombreuses recherches insuffisamment citées, selon Chagnon [8].

Dans une revue de la littérature anglo-saxonne sur ce thème, Conway [10] souligne l'existence de deux courants théoriques outre-Atlantique, celui de la Psychologie du Moi et celui sur la Relation d'objet, dont les psychothérapeutes ont traité par des psychothérapies analytiques des enfants souffrant de TDA/H. Ces deux approches théoriques et leurs conséquences sur la mise en œuvre des techniques psychothérapeutiques sont au final souvent associées l'une à l'autre au cours du processus thérapeutique. Soulignant la possibilité d'une amélioration temporaire lors des psychothérapies de courte durée, l'auteur préconise la réalisation de psychothérapies à long terme, la prise en compte des facteurs environnementaux précoces, du type de fonctionnement cognitif et de la comorbidité anxieuse. En effet, l'existence d'une comorbidité anxieuse apparaît un facteur prédictif de réponse favorable aux psychothérapies analytiques.

Fonagy et Target ont publié des études rétrospectives d'évaluation de l'efficacité des thérapies psychanalytiques menées à l'Anna Freud Center, sur une cohorte d'enfants souffrant de TDA/H et présentant des troubles externalisés [15,16]. Leurs résultats sont en faveur d'une meilleure amélioration clinique chez les sujets ayant bénéficié d'une psychothérapie analytique de longue durée. L'efficacité était aussi plus notable chez les patients présentant une comorbidité anxieuse et chez ceux dont les mères avaient un niveau d'anxiété plus faible. Les facteurs prédictifs d'une moindre réponse thérapeutique étaient l'association aux troubles des apprentissages ou au trouble de l'attachement de type évitant.

3.2. Hypothèses psychopathologiques pour penser les aménagements du cadre psychothérapeutique

3.2.1. Défaillance du traitement psychique de l'excitation

Les sujets souffrant de TDA/H ont souvent été décrits comme présentant une défaillance de la mentalisation et de la symbolisation. Ces sujets seraient « intolérants à la mentalisation » du fait qu'elle reste source d'angoisses massives ou source de désorganisation traumatique. Dans l'impossibilité de traiter l'excitation psychique, que son origine soit interne ou externe, le psychisme la dérive en recourant aux registres perceptivo-moteurs et comportementaux au risque d'une structuration progressive d'une « identité néo-hyperactive » assujettissant l'environnement aux défaillances de sa réalité interne [8].

Denis décrit combien l'enfant dans la période de latence demeure excitable et excité, cette condition reflétant une certaine précarité développementale du fonctionnement psychique à cet âge et la dépendance de l'enfant aux conditions de son environnement [13]. Chez les enfants subissant un excès d'excitation libre, le psychisme dans son ensemble va avoir tendance à se désorganiser, mettant en échec les mécanismes de refoulement et forçant à recourir aux mécanismes de la répression.

À l'inverse du refoulement, qui utilise l'investissement des représentations psychiques, la répression convoque des procédés massifs pour réprimer affects et représentations. Cette répression s'accompagne d'une détérioration ou dégradation des représentations voire de la fonction de représentante [36], substituant un système imaginaire au système représentationnel. Dans ce régime imaginaire du fonctionnement psychique, l'excitation est traitée dans le registre de l'emprise par la mise en jeu de la motricité et le recours à des sensations provoquées [13,14].

L'excès d'excitation revêt donc une dimension d'effraction voire de traumatisme psychique. Une voie phobique parallèle est alors constituée telle que décrite par Green dans son article sur la position phobique centrale [23]. L'évitement associatif et les altérations de l'utilisation des structures narratives, favorisés par la discontinuité psychique, apparaissent comme une manifestation du négatif, pouvant aller jusqu'à constituer, en stade ultime, une véritable psychophobie ou phobie de penser [23], une phobie de soi [33].

3.2.2. Discontinuité psychique

Pour Chorus et Ajuriaguerra, l'instabilité est une question de « manque de durée et de continuité de la conduite entière », discontinuité affectant les modes d'organisation conjoints du psychisme qui ne sont possibles qu'à partir d'une certaine permanence temporelle permettant de donner à des fonctions psychiques leur sens et de soutenir leur émergence. J. Ajuriaguerra insiste sur le retentissement sur le vécu du sujet exposé à une telle discontinuité existentielle [11].

Cette hypothèse de la discontinuité psychique fait écho à celle de l'impact d'une discontinuité des relations précoces chez les sujets TDA/H et des liens entre TDA/H et troubles de l'attachement [30]. Deux études françaises récentes ont d'ailleurs montré, d'une part, l'impact des facteurs environnementaux précoces (dont les comportements de type antisociaux des pères et la dépression maternelle) [19,20] et, d'autre part, le rôle des processus d'attachement, en lien avec la qualité du *caregiving* parental, sur la capacité de régulation et de focalisation attentionnelle [17].

Cette expérience de la discontinuité semble participer à la psychopathologie des enfants souffrant de TDA/H dont on pourrait dire avec Berger qu'ils ont des difficultés à être seuls en présence de l'objet [4] et avec Puyuelo qu'ils sont empêchés de mettre en œuvre « une capacité d'être seul en présence et en absence de l'objet », de symboliser l'absence [33]. Ces enfants empêchés d'atteindre le premier palier développemental stable de la période de latence, ces « empêchés de latence », ne peuvent aborder la conflictualité œdipienne comme une possibilité de structurer leur narcissisme. L'absence d'accès au sentiment continu d'existence met en péril leur identité narcissique [33].

4. Périls de l'identité

4.1. Les psychothérapies

Les enfants souffrant de TDA/H pourraient donc bien être plus préoccupés de cohésion identitaire que de satisfaction pulsionnelle.

Les périls de l'identité narcissique s'expriment par « des recours à la motricité par défaillance des processus de pensée, exposant à des cicatrices instrumentales et témoignant d'une véritable pathologie de l'intersubjectivité », c'est-à-dire de l'attachement [33].

D'autre part, selon Ricoeur, « l'identité humaine est avant tout une identité narrative » [34]. Exposés à la discontinuité de leur fonctionnement psychique, de leur sentiment continu d'existence, les enfants souffrant de TDA/H sont entravés dans leur capacité

narrative [3], quelle soit d'ailleurs graphique ou verbale. Peut-être en est-il de même pour les capacités à imaginer, à jouer, comme on peut le constater lors des séances de psychothérapies d'inspiration analytique ?

De fait, les enfants souffrant de TDA/H se verraient contraints d'adopter une « néo-identité hyperactive » associée à une faible conscience de leur trouble, d'une faiblesse des capacités d'insight, d'une absence fréquente de plainte ou de demande. C'est probablement pour ces raisons que le trouble a été décrit comme « hors représentation » et « hors subjectivité » [3].

La réalisation de psychothérapies a permis à Joly de décrire un pôle intrapsychique caractérisé par une faiblesse identitaire et des réseaux identificatoires, un fond dépressif au sens de la dépression essentielle de l'École de Psychosomatique, une angoisse diffuse liée à la fragilité narcissique, des compulsions d'agir, un mauvais contrôle pulsionnel, une faiblesse de la capacité à jouer seul ou en groupe, une difficulté à « utiliser » l'autre, des aspects phobiques avec idéation obsédante et pseudo-rituels, une incapacité foncière à entrer dans une conflictualité œdipienne structurante.

4.2. Le cadre analytique et ses adaptations

Le processus analytique, processus dynamique et transformationnel, justifie d'une permanence du cadre analytique s'appuyant sur la qualité de l'alliance thérapeutique avec l'enfant et ses parents. L'enfant accepte alors de se confronter à une expérience psychique d'un type nouveau comprenant la rencontre avec la fonction analytique du psychothérapeute [6].

4.2.1. Propositions d'ajustements du cadre analytique

Il revient à chaque psychothérapeute de déterminer le fonctionnement du cadre analytique. Les choix théoriques de l'analyste sont un aspect majeur qui conditionne la mise en œuvre de modalités techniques particulières.

4.2.1.1. *Du point de vue du psychothérapeute.* Face à « l'indécidabilité de l'origine », le psychothérapeute ne traite pas une pathologie mais un sujet. Les mises en tension concernant les mécanismes étiopathogéniques du trouble risquent alors de compromettre le processus thérapeutique. Ainsi, Berger invite le psychothérapeute à « laisser jouer en lui ses différentes hypothèses » [3], ce qui permet en outre de continuer d'explorer la clinique singulière du sujet et de mieux tenir compte des effets des modifications environnementales en termes de dynamique familiale ou d'évolution du contexte socioculturel.

Nous le savons depuis les travaux de Cahn, le contexte socioculturel a évolué, de sorte qu'au modèle névrotico-œdipien prédominant au siècle dernier s'est substitué pour partie un modèle dans lequel la dimension narcissique est plus présente [7]. Cette évolution est d'autant plus importante à prendre en compte pour les enfants et les adolescents qu'elle coexiste avec la révolution virtuelle actuelle et qu'elle fait écho aux fragilités identitaires et narcissiques des sujets souffrant de TDA/H.

4.2.1.2. *Influence du modèle complexe plurifactoriel.* La référence à un modèle psychopathologique complexe et plurifactoriel peut permettre de relier le positionnement interne du psychothérapeute à la réalité environnementale « élargie », individuelle, sociale et culturelle du patient et de sa famille.

Ce positionnement permet aussi de ne pas négliger les altérations instrumentales associées au trouble et de prendre en compte les perturbations de la parentalité, en renforçant la nécessité d'un dispositif thérapeutique plurifocal et multidisciplinaire [4].

En ce qui concerne l'enfant, il est question de traiter conjointement la symptomatologie clinique en rapport avec les

défaillances de l'organisation psychique et la fragilité narcissique du sujet, d'une part et, d'autre part, de permettre que soient traitées les altérations des fonctions cognitives et instrumentales [26]. De même, le travail de liaison avec les lieux scolaires et sociaux de l'enfant peut être partie intégrante du dispositif thérapeutique, même si confié à d'autres professionnels qui s'organisent en une « constellation bienveillante » autour de l'enfant.

À l'interface de l'intimité du travail psychothérapeutique de l'enfant et de sa réalité existentielle qui accueille et témoigne de retentissements des troubles de l'enfant, les parents occupent une place « pivot » du dispositif thérapeutique. Ne plus sous-entendre leur responsabilité directe, en particulier celle des mères, est un minimum requis [3] qui renforce la possibilité d'une alliance thérapeutique pérenne et durable.

Les difficultés éducatives parentales ne sont pas rares, ce qui justifie un travail d'étayage et de réflexion commune à propos du dispositif thérapeutique et de son évolutivité éventuelle. Investi comme « co-créateur » du dispositif thérapeutique, le sentiment d'incompétence face à la fonction parentale et de fragilité narcissique des parents s'amenuise, apaisant leurs manifestations anxieuses ou hostiles envers l'enfant.

Donner accès aux parents aux problématiques de la complexité de la clinique et des hypothèses étiopathogéniques sous-jacentes peut permettre de protéger l'espace thérapeutique des retentissements de l'exposition aux dichotomies théoriques auxquelles les patients et leur famille peuvent se trouver confrontés au cours de leur parcours de soins et de prévenir le risque de rupture prématurée du processus thérapeutique en cas notamment de recours à la prescription associée d'un psychotrope.

Elle permet également de justifier d'une temporalité *a priori* longue du travail psychothérapeutique qui s'engage du fait de l'exposition de l'enfant au phénomène de la discontinuité psychique, temporalité nécessaire pour que se développe un processus dynamique transférentiel chez des enfants qui présentent des difficultés d'investissement de la relation aux autres.

L'évocation de l'hypothèse d'une dimension neuro-développementale inhérente au TDA/H peut avoir des aspects positifs sur la modification des positionnements parentaux sous la forme d'un « lâcher-prise », sorte de bonne résignation qui permet aux parents de mieux interagir avec leur enfant lors des moments d'agitation, d'opposition ou d'emprise relationnelle [3]. Dans un deuxième temps, peut s'ouvrir la possibilité d'un véritable travail psychothérapeutique sur l'enfance des parents, sur les projections parentales sur l'enfant, voire permettre aux parents d'accéder à un travail psychothérapeutique individuel.

D'autre part, le travail d'historicisation des troubles et du parcours de soins, en présence de l'enfant, revêt une grande importance au regard des altérations des capacités narratives et de la fragilité narcissique de ces enfants. C'est aussi possiblement une manière de minimiser le risque d'impact des enjeux identitaires du diagnostic du trouble pour l'enfant, ses parents et le psychothérapeute.

4.3. Propositions concernant la technique analytique

Lors des psychothérapies avec les enfants souffrant de TDA/H, le psychothérapeute peut être confronté à plusieurs types de difficultés techniques inhérentes aux prises en charge des patients présentant des troubles de la mentalisation et de la symbolisation, enfants pouvant se manifester en séance par des troubles du comportement, enfants tellement vulnérables qu'ils résistent à investir un véritable processus dynamique et transformationnel.

Si l'on peut compter sur la temporalité de la relation transférentielle pour opérer comme un levier dynamisant le processus thérapeutique, la question de l'utilisation de l'interprétation a interrogé plusieurs auteurs. Fonagy et Target ont par exemple préconisé de privilégier les interprétations sur le processus psychanalytique plutôt que sur le matériel inconscient, représentationnel [15,16]. Les analystes nord-américains ont quant à eux posé la question de l'interprétation du contre-transfert négatif chez des enfants présentant de trop grandes fragilités narcissiques [10], bien que l'on ne puisse penser que l'emploi de l'interprétation du contre-transfert négatif demeure pertinent dans le suivi des parents, notamment lors du travail sur les projections parentales sur l'enfant. Par ailleurs, selon une étude suédoise, il pourrait être intéressant d'utiliser avec prudence les interprétations métaphoriques, en fonction de la maturité de la fonction de représentant de l'enfant [36], le système de représentation de choses et de mots pouvant être plus ou moins défaillant [37].

Enfin, soulignons l'intérêt de la mise en œuvre de processus de co-création, hérité de Winnicott et de sa théorie de la transitionnalité [42]. Ces approches permettraient de mieux prendre en compte les difficultés de l'enfant à être seul en présence de l'objet, de soutenir le travail psychothérapeutique sur les identifications, de mettre au travail la possibilité d'un insight vis-à-vis du vécu de discontinuité psychique facilitant une meilleure efficacité des interprétations historiques et transféro-contretransférentielles et intégrant les évitements associatifs et manifestations psychophobiques à la dynamique du processus thérapeutique.

5. Les associations entre pharmacothérapie et psychothérapie d'inspiration psychanalytique

5.1. Points de vue théoriques

L'article de Jeammet, « Démystifier les psychotropes : un outil parmi d'autres », paru en 2002, fut une contribution majeure à l'évolution des dichotomies théoriques existant entre prescripteurs et psychothérapeutes.

L'importance du rôle des mécanismes épigénétiques et des interactions entre néoténie développementale et environnement constituerait un préalable théorique qui permettrait de décrire les potentialisations réciproques entre vulnérabilité biologique et défaillance des ressources psychiques, potentialisations qui rendent l'enfant d'autant plus dépendant des qualités de son environnement pour gérer sa réalité interne et franchir les étapes de son développement global. La part des contraintes biologiques internes y est mise en avant comme ayant fonction de facteurs biologiques d'activation de l'angoisse et de l'insécurité interne.

L'auteur fait l'hypothèse que les potentialités gnosiques et praxiques des enfants hyperactifs pourraient avoir été modifiées sous l'effet de contraintes subies au cours des premières années de vie, créant l'équivalent de lésions anatomiques appauvrissant les capacités associatives, difficilement réversibles ou partiellement réversibles même lors du remaniement pubertaire.

Les psychotropes permettraient un apaisement de la contrainte biologique interne, agissant comme moyens de contenance du Moi en menace d'être débordé. Il avance l'idée des psychotropes comme « outil de liberté » car « ils offrent la possibilité de délivrer le sujet, pour partie du moins, du poids des contraintes émotionnelles et cognitives qui freinent ses capacités d'élaboration et de déplacement, c'est-à-dire ce qui constitue l'essentiel des prérequis d'un travail psychothérapeutique » [25].

« L'avenir nous apprendra peut-être à agir directement à l'aide de certaines substances chimiques, sur les quantités d'énergie et leur répartition dans l'appareil psychique » : cette citation de Freud [18] ouvre l'article de Widlöcher sur les rapports entre pharma-

cothérapie et psychothérapie. L'auteur y décrit l'existence d'une « double contrainte », c'est-à-dire d'une contrainte réciproque entre changements psychiques et neurophysiologiques.

À tout événement mental correspond un événement physiologique, l'état cérébral déterminant et contraignant l'état mental et tout changement d'état mental modifiant l'état cérébral. Dans ce modèle théorique, « la prescription d'un psychotrope détermine un changement d'état cérébral et son effet réalise un changement d'état mental ».

Le psychotrope, en « contraignant » le système cérébral à s'affranchir de son fonctionnement de base, aiderait l'ensemble du système cérébral et mental à rétablir une autorégulation satisfaisante. Le psychotrope, dans sa forme actuelle, ne réparerait pas une carence mais contraindrait les réseaux neuronaux complexes, sollicités dans les psychothérapies, à trouver un nouvel équilibre.

En conclusion de son article, Widlöcher propose une recommandation : « Les pressions qui s'exercent entre réponse psychique et mécanisme neuronal d'exécution, entre systèmes modulaires d'action et de représentation et mécanismes de régulation de base, doivent être pris en considération dans toute stratégie thérapeutique qui combine psychothérapie et médicament » [41].

Les travaux de Kandel sur les bases moléculaires de la mémoire à court et à long terme, qui lui valurent le prix Nobel de Physiologie et Médecine en 2000, ouvrent et soutiennent des perspectives nous invitant à ne pas négliger que les psychothérapies, notamment analytiques, et la pharmacothérapie pourraient induire des modifications similaires dans les variations de l'expression des gènes et sur les variations détectables de la structure cérébrale. L'usage conjoint des psychothérapies et de la pharmacothérapie pourrait donc être particulièrement efficace de par l'effet d'une potentialisation interactive et synergique – non pas seulement additive – de ces deux types de traitement. Il rappelle également qu'il est probable que les mécanismes thérapeutiques agissant sur l'inconscient aient des modalités de fonctionnement singulières et en conclut que les psychothérapies d'inspiration analytiques gardent tout leur intérêt [28,29].

5.2. Les effets du méthylphénidate

La prescription de méthylphénidate, traitement médicamenteux de référence et de première intention, est une indication thérapeutique basée essentiellement sur un diagnostic clinique sérieusement établi et sur l'évaluation du retentissement occasionné par le TDA/H. Elle doit tenir compte des pathologies comorbides associées et s'inscrire dans un projet thérapeutique multimodal et personnalisé [2,40].

Le méthylphénidate est probablement le psychotrope le mieux étudié de la pharmacopée des psychotropes prescrits chez l'enfant et l'on sait que ce traitement est suspensif et non curatif. Parmi eux, la Ritaline[®] permettrait un bénéfice thérapeutique chez 70 % des enfants sous ce traitement. L'évaluation des effets thérapeutiques concerne essentiellement l'amélioration du comportement (opposition et agressivité) et les performances scolaires. De même, il améliorerait les interactions sociales et l'estime de soi [2].

Si les effets à court terme sont reconnus, les effets à long terme seraient moins renseignés : le trouble attentionnel ne serait pas modifié et il y aurait moins d'évolution péjorative à l'âge adulte vers le Trouble des Conduites chez les enfants traités.

L'efficacité serait nette sur l'attention, les performances mnésiques, l'agitation motrice et l'impulsivité. Au plan attentionnel, des études ont montré une amélioration de l'attention générale, des résultats aux épreuves d'attention continue et une diminution de la distractibilité. Concernant la composante motrice du trouble, l'instabilité, l'agitation et l'hyperactivité motrice seraient diminuées. La diminution conjointe de l'impulsivité, de

l'opposition et de l'agressivité participerait à améliorer les relations interpersonnelles [5].

Il existe peu d'études évaluant l'efficacité des traitements associant psychothérapie d'inspiration analytique et méthylphénidate. Citons l'étude française de Chambry et al. dont les résultats, non généralisables du fait d'un échantillon trop petit, concordent avec les données de la littérature concernant l'absence d'effet curatif du méthylphénidate sur le déficit attentionnel et l'intérêt des psychothérapies pour le traitement des troubles comorbides associés, notamment les troubles anxieux [9].

Il n'existe aucune étude ou donnée ayant évalué le vécu subjectif des enfants traités par méthylphénidate, alors que les associations thérapeutiques entre pharmacothérapie et thérapies comportementales et cognitives ou psycho-éducatives sont recommandées [24].

5.3. Association entre pharmacothérapie et psychothérapie d'inspiration psychanalytique : à propos d'un cas

Un biais de sélection existe probablement dans le recrutement des enfants accédant aux psychothérapies analytiques et ceci possiblement du fait qu'ils présenteraient des formes de troubles dont l'expression émotionnelle serait plus marquée.

Thibaud a six ans lorsque ses parents consultent pour une demande de psychothérapie analytique, qui dure depuis cinq ans, sur les conseils de son orthophoniste qui le suit pour un retard de langage, rééducation qui se poursuivra en parallèle pendant deux années. Au cours de son parcours de soins, Thibaud bénéficiera successivement d'un bilan neuropsychologique et d'une rééducation attentionnelle associée à sa psychothérapie qui sera ponctuée de consultations thérapeutiques régulières auprès des parents.

À l'âge de six ans, Thibaud est un enfant dont l'agitation psychomotrice majeure dans l'environnement familial et scolaire contraste avec l'inhibition psychique massive en séance. Durant plusieurs mois, l'enfant ne pourra utiliser le langage verbal, s'exprimant préférentiellement par des onomatopées et tentant de contenir son angoisse et son excitation psychique par des rires défensifs. La différence des sexes et des générations n'est pas acquise. Les capacités narratives et imaginaires sont empêchées, le graphisme et le dessin sont le plus souvent évités. Il manifeste sa difficulté à être seul en présence de l'objet en se cachant et en évitant les échanges verbaux. La fragilité identitaire finit néanmoins par se représenter sous la forme d'un dessin de bonhomme qui s'avère être un bonhomme de neige menacé de fondre au soleil, construit par une fille et dont il dit qu'il le représente. Progressivement, Thibaud organise, par le biais d'un jeu de dominos, la différence des générations et l'ébauche d'une scène primitive. Les discontinuités calendaires dans le rythme des séances réactualisent des périodes de régression dont l'intensité diminue dans le temps. Apparaît alors une problématique d'identité de genre, Thibaud se manifestant en tant que fille, ce qui est mis au travail dans le processus thérapeutique par la réalisation de *squiggle* jusque-là impossible. En parallèle s'ouvre la possibilité d'un jeu partagé dans lequel il exprime sa destructivité, sa crainte de l'échec et son besoin d'emprise sur l'autre et sur les règles du jeu qui sont systématiquement remaniées afin d'être évitées.

Sous traitement médicamenteux, la dynamique et le contenu des séances se modifient. Pour la première fois, Thibaud raconte en séance ses vacances en famille. La discontinuité psychique et les évitements phobiques régressent progressivement, augmentant les capacités narratives. La survenue du décès d'un grand-père est verbalisée avec une bonne qualité d'*insight*, les émotions sont nommées, là où l'on aurait pu craindre une réactivation massive

des angoisses de perte. Les rituels préexistants dans les séances sont lentement désinvestis, sur un mode non linéaire, au profit d'un échange verbal et graphique portant sur la construction identitaire. Les capacités d'apprentissage se trouvent améliorées, l'anxiété scolaire diminue et l'enfant investit son identité d'élève. Cependant, la question des effets psychiques du traitement médicamenteux reste peu abordable en dehors d'une reconnaissance d'un effet sur les capacités de concentration. Sur proposition de Thibaud, est réalisé un travail conjoint d'élaboration d'un scénario de film, synopsis et *story board*, contant l'histoire d'un élève, dessiné de manière complète et différenciée, un élève en interaction avec ses professeurs et ses pairs est initié. En parallèle, Thibaud parle de sa propre place et ses capacités associatives ont émergé.

5.4. Discussion

Le cas clinique présenté permet d'illustrer plusieurs hypothèses. Sous l'effet de l'association psychotrope-psychothérapie analytique, la diminution de la contrainte biologique interne portant sur l'atténuation de l'instabilité motrice et le renforcement des capacités attentionnelles semble avoir favorisé un meilleur traitement de l'excitation qui perd ainsi de son caractère effrayant et traumatique permettant une diminution des mécanismes d'évitement psychophobique. La discontinuité de pensée amoindrie favoriserait l'accès à un meilleur insight et le passage des représentations de choses aux représentations de mots. La confrontation aux conflits psychiques internes s'en trouverait soutenue et le travail de liaison secondarisée entre affect et représentation renforcé.

En s'inscrivant dans un rapport plus continu au temps, accédant aux représentations de mots, les capacités narratives du sujet pourraient émerger, ce qui pourrait soutenir la construction de l'identité narrative du sujet. L'émergence de ses capacités narratives participerait à minimiser les « périls » de l'identité, le risque de collusion identitaire pour le sujet, capable notamment de se percevoir modifié par la prise d'un psychotrope. Dans ce sens, les effets psychiques des psychotropes peuvent faire l'objet d'un travail dans les séances [21].

La combinaison de ces différentes émergences, conscientes et inconscientes, participerait à soutenir une relance du processus analytique et du processus développemental.

Soulignons, à nouveau, l'importance de la constitution d'un dispositif de soins multimodal, adapté dans le temps en fonction du développement de l'enfant, dispositif devant tenir compte du retentissement des comorbidités psychiatriques et instrumentales (condition nécessaire mais parfois insuffisante) et associant les parents au processus thérapeutique. Cette modalité thérapeutique peut permettre de soutenir les facteurs motivationnels de l'enfant (et de ses parents), facteurs connus pour participer à la psychopathologie du trouble et qui constituent un facteur de risque d'échappement au processus thérapeutique.

L'association entre pharmacothérapie et psychothérapie analytique semble pouvoir participer d'une modification des mécanismes cérébraux de régulation de base du psychisme, en le contraignant à un moindre recours à un fonctionnement par défaut, sollicitant la relance développementale de fonctionnalités émergentes complexes du psychisme. Ainsi pourraient se développer des fonctions d'élaboration d'un modèle interne « d'autoreprésentation des propriétés émergentes du réseau, et, au sein du réseau, une propriété qui soulignerait la capacité à « faire émerger » qui comporterait une fonction réflexive » [36].

D'un consensus clinique vers un consensus thérapeutique ? Face à « l'hypercomplexité » de nos objets d'étude, modestie et humanisme s'imposent. Est-il besoin de rappeler que la diversité et

la complémentarité des approches théoriques, appréhendées avec bienveillance, constituent une voie d'avenir, un devoir éthique dans l'intérêt de tous ? La réflexion reste résolument ouverte.

Déclaration d'intérêts

C.G. Laboratoire Lundbeck 2012/2013.

Références

- [1] Adrian V. Trouble hyperactivité et déficit de l'attention chez l'enfant et l'adolescent : comorbidité et tempérament. À propos d'une étude clinique de 38 patients [thèse]. Bordeaux: Université Victor Segalen; 1998.
- [2] Bange F, Mouren MC. Le point de vue du prescripteur. In: Joly F, editor. L'hyperactivité en débat. Paris: Érès « Le Carnet psy»; 2005. p. 39–46.
- [3] Berger M. « Sait-on jouer avec l'instabilité ? » In: Joly F, editor. L'hyperactivité en débat. Paris: Érès « Le Carnet psy»; 2005. p. 29–38.
- [4] Berger M. L'enfant instable, approche clinique et thérapeutique. Paris: Dunod; 1999.
- [5] Bouvard M, Martin-Guehl C, Réneric JP. Troubles hyperactifs chez l'enfant. *Encycl Med Chir* 2002 [37-201-B-10].
- [6] Brusset B. Psychanalyse et psychothérapie. Paris: Elsevier; 1994 [37-810-F-50].
- [7] Cahn R. Adolescence et folie. Les déliations dangereuses. Paris: PUF; 2004.
- [8] Chagnon JY. Plaidoyer pour un abord psychopathologique de l'hyperactivité. *Perspect Psy* 2006;45:331–8.
- [9] Chambry J, Billard C, Guinard M, Lacaze E, Idiart M, Delteil-Pinton F, et al. Le trouble déficitaire de l'attention, avec ou sans hyperactivité (TDA/H) : une approche pluridisciplinaire longitudinale de 36 enfants. *Encephale* 2011;37:180–90.
- [10] Conway F. Psychodynamic Psychotherapy of ADHD: a review of the literature. *Psychotherapy* 2012;49(3):404–17. DOI:10.1037/a0027344.
- [11] De Ajuriaguerra J. Comparaison entre les notions de syndrome d'instabilité psychomotrice et de syndrome hyperkinétique. *Enfance Psy* 2012;54:147–57.
- [12] Delvenne V. L'enfant agité : par-delà les hypothèses étiopathogéniques. *Neuropsychiatr Enfance Adolesc* 2013;61:137–9.
- [13] Denis P. Emprise et répression. *Rev Fr Psychanal* 2001;65:29–36.
- [14] Denis P. L'excitation à la période de latence ; entre refoulement et répression. *Enfances Psy* 2001;14:77–83.
- [15] Fonagy P, Target M. The efficacy of psychoanalysis for children with disruptive disorders. *JAACAP* 1994;33:45–55.
- [16] Fonagy P, Target M. Playing with reality: I. Theory of mind and normal development of psychic reality. *Int J Psychoanal* 1996;77:217–33.
- [17] Franc N, Maury M, Purper-Ouakil D. Trouble déficitaire de l'attention/hyperactivité (TDAH) : quels liens avec l'attachement ? *Encephale* 2009;35:256–61.
- [18] Freud S. Abrégé de psychanalyse. Trad. Fr. Berman A. Paris: PUF; 1964.
- [19] Galéra C, Bouvard MP, Lagarde E, Michel G, Touchette E, Fombonne E, et al. Childhood attention problems and socioeconomic status in adulthood: 18-year follow-up. *BJP* 2012;201:5.
- [20] Galéra C, Bouvard MP, Pingault JB, Melchior M, Michel G, Boivin M, et al. Early risk factors for hyperactivity-impulsivity and inattention trajectories from age 17 months to 8 years. *Arch Gen Psychiatry* 2011;68:1267–75.
- [21] Golse B, Zigante F. L'enfant, les psychotropes et la psychanalyse. *Rev Fr Psychanal* 2002;66:433–46.
- [22] Golse B. Comment devons-nous traiter l'hyperactivité avec déficit de l'attention. *Le Carnet PSY* 2004;3:23–9.
- [23] Green A. La position phobique centrale avec modèle de l'association libre. *Rev Fr Psychanal* 2000;64:743–72.
- [24] Conduite à tenir devant un enfant ou un adolescent ayant un déficit de l'attention et/ou un problème d'agitation. *Recommandations de bonne pratique*. Saint-Denis La Plaine: Haute Autorité de Santé; 2012.
- [25] Jeammet P. Démystifier les psychotropes : un outil parmi d'autres. *Rev Fr Psychanal* 2002;66:423–31.
- [26] Joly F. Le tourbillon instable ! Agitations théorico-cliniques autour de l'enfant agité. In: Joly F, editor. L'hyperactivité en débat. Paris: Érès; 2005. p. 95–126.
- [27] Joly F. Pour aller plus loin. In: Joly F, editor. L'hyperactivité en débat. Paris: Érès; 2005. p. 127–48.
- [28] Kandel ER. Biology and future of psychoanalysis: a new intellectual framework for psychiatry revisited. *Am J Psychiatry* 1999;156:505–24.
- [29] Kandel ER. A new intellectual framework for psychiatry. *Am J Psychiatry* 1998;155:457–69.
- [30] Mallarive J, Bourgeois M. L'enfant hyperkinétique : aspects psychopathologiques. *Ann Med Psychol* 1976;134–41. p. 107–19.
- [31] Ménechal J. L'hyperactivité infantile, débats et enjeux. Paris: Dunod; 2002.
- [32] Morin E. Introduction à la pensée complexe. Paris: PUF; 1990.
- [33] Puyuelo R. « Les enfants vulnérables ». *Approche psychopathologique*. *Empan* 2012;85:88–95.
- [34] Ricœur P. Soi-même comme un autre. Paris: Le Seuil; 1990.
- [35] Robert M. Perspectives psychanalytiques sur le développement du trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (THADA). *Rev Fr Psychanal* 2008;72:1213–26.
- [36] Roussillon R. La représentation et l'actualisation pulsionnelle. *Rev Fr Psychanal* 2007;71:339–57.

- [37] Salomonsson B. L'impact des mots sur les enfants souffrant d'une hyperactivité associée à un déficit de l'attention (ADHD), conséquences pour la technique analytique. *Année Psychanal Int* 2007;1:99–118.
- [38] Thomas J, Willens G. *Troubles de l'attention, impulsivité et hyperactivité chez l'enfant : approche neuropsychologique*. Paris: Masson; 1997.
- [39] Thoumy AL. *TDA/H et troubles bipolaires. Étude de la comorbidité et du recouvrement symptomatique dans une population présentant un TDA/H*. [thèse] Bordeaux: Université Victor Segalen; 2009.
- [40] Welniarz B, Lauth B. « Le traitement de l'hyperactivité » autour de la prescription de psychostimulants. *Perspect Psy* 2011;50:78–85.
- [41] Widlöcher D. L'avenir nous apprendra peut-être... *Psychothérapie et chimiothérapie : quels rapports ? Rev Fr Psychanal* 2002;66:361–9.
- [42] Winnicott DW. *Jeu et réalité. L'espace potentiel*. Paris: Gallimard; 2000.